

**9 класс****Задача 1. «Чёрный ящик»**

Известно, что внутри «чёрного ящика» находятся несколько вставок с вертикальными вырезами квадратного сечения (рис. 1). Найдите длину стороны выреза  $a_i$  и высоту  $b_i$  каждой вставки, начиная с уровня, на котором в коробку вставлена трубочка.

Проделайте ваши измерения повторно. Оцените погрешности измерений.




Рис. 1

*Оборудование.* «Чёрный ящик» (коробка из-под сока со вставленной трубочкой от коктейля), шприц на 20 мл, миллиметровая бумага, скотч, вода.

**9 класс****Задача 2. Тур маслом не испортишь**

Предложите способ, благодаря которому с помощью предложенного оборудования можно определить плотность  $\rho$  растительного масла. Соберите экспериментальную установку. Схематично изобразите её в отчёте. Выполните необходимые измерения. Для получения большей точности повторите эксперимент не менее 5 раз.

Таблица 1

№ опыта	$x_1$ , [ед.] <sub>1</sub>	$x_2$ , [ед.] <sub>2</sub>	...	$\rho$ , кг/м <sup>3</sup>
1				
2				
3				
4				
5				
Среднее значение				

Начертите в отчёте таблицу по аналогии с таблицей 1, где  $x_1$ ,  $x_2$ , ... — измеряемые величины, а [ед.]<sub>1</sub>, [ед.]<sub>2</sub>, ... — условные обозначения размерностей этих величин. Результаты экспериментов занесите в таблицу и усредните. Приведите полученное значение  $\rho$ .

*Примечание.* Плотность воды  $\rho_0 = 1000$  кг/м<sup>3</sup>.

*Оборудование.* Прозрачный цилиндрический сосуд, ёмкость с водой, прозрачная пластиковая трубочка, пластиковая линейка, скотч, ёмкость с растительным маслом, шприц, бумажные салфетки для поддержания в чистоте рабочего места.

**10 класс****Задача 1. «Чёрный ящик»**

Известно, что внутри «чёрного ящика» находятся несколько вставок с вертикальными вырезами квадратного сечения (рис. 1). Найдите длину стороны выреза  $a_i$  и высоту  $b_i$  каждой вставки, начиная с уровня, на котором в коробку вставлена трубочка.

Проделайте ваши измерения повторно. Оцените погрешности измерений.




Рис. 1

*Оборудование.* «Чёрный ящик» (коробка из-под сока со вставленной трубочкой от коктейля), шприц на 20 мл, миллиметровая бумага, скотч, вода.

**10 класс****Задача 2. Избыточное давление**

Используя имеющееся оборудование, измерьте избыточное давление воздуха в шарике (разность давления внутри него с атмосферным давлением), когда диаметр шарика в надутом состоянии равен примерно 25 см.

1. Найдите объём надутого шарика и оцените погрешность измерения этой величины.

2. Опишите метод измерения разности давлений  $\Delta p$  и изобразите схематически установку. Выведите формулу для определения  $\Delta p$ .

3. При надувании шарика вместе с воздухом человек вдувает в шарик пары воды, которые конденсируются на оболочке. Этот конденсат влияет на точность измерений. Как исключить из рассчётов это влияние?

4. Рассчитайте  $\Delta p$ , проведя придуманный вами эксперимент.

5. Для улучшения точности повторите эксперимент и усредните полученные результаты.

*Примечание.* Молярная масса воздуха  $\mu = 29$  г/моль, комнатную температуру сообщают организаторы.

*Оборудование.* Воздушный шарик, нитки, ножницы, неоднородный стержень (соломинка для коктейлей с пластилином внутри), линейка, штатив с лапкой, 2 листа офисной бумаги формата А4 (поверхностная плотность бумаги  $\rho' = 80$  г/м<sup>2</sup>).

**11 класс****Задача 1. Вязкость масла**

Рассмотрим вязкую несжимаемую жидкость, текущую вдоль длинной узкой цилиндрической трубы. Если при движении слои жидкости не перемешиваются (рис. 1), а малые выделенные объемы жидкости движутся прямолинейно, то данное течение жидкости называют *ламинарным*.




Рис. 1

Для ламинарного течения известны уравнения, достаточно точно описывающие движение жидкости. При превышении скоростью некоторой критической величины течение становится неустойчивым. В среде образуются вихри, а линии тока становятся нестационарными (рис. 2). Такое движение называют *турбулентным*. Его удается описывать только приближенно.




Рис. 2

В данном эксперименте вам предлагается исследовать течение жидкости под действием различных давлений, обработать результаты эксперимента в предположении, что течение ламинарно, и в конце выяснить, верно ли данное предположение.

1. Предложите способ, с помощью которого можно снять зависимость расхода  $Q$  масла (объем жидкости, протекающему через сечение трубы в единицу времени) через иглу шприца от разности давлений  $\Delta p = p_2 - p_1$  на концах иглы.

*Подсказка.* При заполнении шприца маслом оставьте внутри него некоторое количество воздуха.

2. Используя предложенный вами способ, снимите зависимость  $Q(\Delta p)$  при нескольких значениях разности давлений (не менее 4 точек). Страйтесь при

этом выбирать давления так, чтобы диапазон разности давлений был максимальным из доступных, а точки в этом диапазоне были распределены достаточно равномерно.

Если течение окажется ламинарным, то его можно будет описать с помощью формулы Пуазейля:

$$Q = \frac{\pi r^4}{8 \eta L} \Delta p, \quad (1)$$

где  $\eta$  — вязкость жидкости,  $L$  — длина иглы шприца,  $r$  — внутренний радиус иглы.

3. По полученным в предыдущем пункте данным постройте график зависимости расхода от разности давлений. Используя (1), найдите вязкость масла.

Для выяснения, является ли течение жидкости ламинарным, используют так называемое число Рейнольдса  $Re$ . По определению:

$$Re = \frac{\rho v r}{\eta}, \quad (2)$$

где  $\rho$  — плотность жидкости,  $v$  — средняя скорость её течения.

В случае движения жидкости по цилиндрической трубе критическое значение числа Рейнольдса, при котором течение уже нельзя считать ламинарным, равно  $Re_{kp} = 1200$ .

4. Вычислите число Рейнольдса для вашего эксперимента. Сравнив его с  $Re_{kp}$ , определите характер течения жидкости в игле шприца.

На концах трубы (там, где жидкость только входит в цилиндрическую полость иглы) течение весьма неоднородно. Расстояние от края иглы, на котором оно устанавливается и становится ламинарным, называется  $l_{ust}$ .

Формула (1) выведена для ламинарного течения по длинной трубе. Если оказывается, что  $l_{ust} \ll L$ , где  $L$  — длина иглы шприца, то краевыми неоднородностями можно пренебречь, и использование соотношения (1) оправдано.

5. Для игры  $l_{ust} = 0,2r Re$ . Определите  $l_{ust}$  для вашего эксперимента и сравните его с  $L$ .

6. Теперь, используя все полученные результаты, сделайте вывод о том, верно ли предположение, что течение масла ламинарно.

*Оборудование.* Шприц (внутренний диаметр иглы  $d = 0,6$  мм), сосуд с маслом, секундомер, бумажные салфетки (для поддержания рабочего места в чистоте), лист миллиметровой бумаги, пластиковая бутылка.

**ВНИМАНИЕ!** Аккуратно обращайтесь со шприцем, чтобы не пораниться острой иглой.

**11 класс**

**Задача 2. Избыточное давление**

Используя имеющееся оборудование, измерьте избыточное давление воздуха в шарике (разность давления внутри него с атмосферным давлением), когда диаметр шарика в надутом состоянии равен примерно 25 см.

1. Найдите объём надутого шарика и оцените погрешность измерения этой величины.

2. Опишите метод измерения разности давлений  $\Delta p$  и изобразите схематически установку. Выведите формулу для определения  $\Delta p$ .

3. При надувании шарика вместе с воздухом человек вдувает в шарик пары воды, которые конденсируются на оболочке. Этот конденсат влияет на точность измерений. Как исключить из рассчётов это влияние?

4. Рассчитайте  $\Delta p$ , проведя придуманный вами эксперимент.

5. Для улучшения точности повторите эксперимент и усредните полученные результаты.

*Примечание.* Молярная масса воздуха  $\mu = 29$  г/моль, комнатную температуру сообщают организаторы.

*Оборудование.* Воздушный шарик, нитки, ножницы, неоднородный стержень (соломинка для коктейлей с пластилином внутри), линейка, штатив с лапкой, 2 листа офисной бумаги формата А4 (поверхностная плотность бумаги  $\rho' = 80$  г/м<sup>2</sup>).

**11 класс**

**Задача 2. Избыточное давление**

Используя имеющееся оборудование, измерьте избыточное давление воздуха в шарике (разность давления внутри него с атмосферным давлением), когда диаметр шарика в надутом состоянии равен примерно 25 см.

1. Найдите объём надутого шарика и оцените погрешность измерения этой величины.

2. Опишите метод измерения разности давлений  $\Delta p$  и изобразите схематически установку. Выведите формулу для определения  $\Delta p$ .

3. При надувании шарика вместе с воздухом человек вдувает в шарик пары воды, которые конденсируются на оболочке. Этот конденсат влияет на точность измерений. Как исключить из рассчётов это влияние?

4. Рассчитайте  $\Delta p$ , проведя придуманный вами эксперимент.

5. Для улучшения точности повторите эксперимент и усредните полученные результаты.

*Примечание.* Молярная масса воздуха  $\mu = 29$  г/моль, комнатную температуру сообщают организаторы.

*Оборудование.* Воздушный шарик, нитки, ножницы, неоднородный стержень (соломинка для коктейлей с пластилином внутри), линейка, штатив с лапкой, 2 листа офисной бумаги формата А4 (поверхностная плотность бумаги  $\rho' = 80$  г/м<sup>2</sup>).